جایگاه بیمار با بیماریهای واگیر

پذیرش بیمار

رعایت احتیاطات استاندارد جهت تمام بیماران

بیماری عفونی واگیر ثابت شده ؟

- **خیر** → **رعایت احتیاطات استاندارد**
- **بله** → **بیمار به اتاق ایزوله انتقال یابد.اگرامکان فراهم نبود با کنترل عفونت مشاوره شود.**

احتیاطات تنفسی
(Droplet ,Air born)

۱. جهت تمام کارکنان و ملاقات کنندگان در محل ورود به اتاق ماسک قرار داده شود.
۲- در زمان ترک اتاق ماسک و محافظهای شخصی خارج شوند.
۳- درب اتاق بسته باشد.
۴- بیمار در اتاق بماند مگر جهت انجام امور درمانی که در اتاق امکان ندارد.
۵- بیمار به هر دلیلی که اتاق را ترک میکند ماسک بپوشد.

احتیاطات جهت مقاومتهای میکروبی

۱- شستن دست قبل و بعد از تماس با بیمارولوازم اطراف وی
۲- از لوازمی مثل کاف فشار خون و گلوکومتر ترمومتر اختصاصی استفاده شود.
۳- مواد ضدعفونی دستها در اتاق قرار گیرد.
۴- حتی در صورت عدم تماس با بیمار دستکش و گان پوشیده شود.
۵- لوازم محافظت شخصی در سطل زرد انداخته شود
۶- ممکن است فرد ، بیماری دیگری هم داشته باشد که لازم است همزمان دو نوع ایزولاسیون انجام گردد.

مثال:
VRE, VRSA, MRSA,

احتیاطات تماسی

۱- بهداشت دست قبل و بعد از تماس با بیمار و لوازم اطراف وی
۲- اتاق جداگانه
۳- از لوازم مانند کاف فشار خون و گلوکومتروترمومتربصورت اختصاصی استفاده شود.
۴- از محافظت کننده شخصی در زمان تماس با خون و ترشحات بیماراستفاده شود.

مثال:
اسهالی که با دایاپر کنترل نشود. زخمی که ترشحات آن با پانسمان کنترل نشود. زونای منتشر و..

برای موارد Droplet

اتاق ایزوله بدون فشار منفی نیاز است.

مثال:
انفلوانزا
مننژیت مننگوکوکی
سیاه سرفه
اوریون
سرخجه
دیفتری
رعایت فاصله حداقل ۱ متر کافی است

برای موارد Air born

اتاق ایزوله با فشار منفی نیاز است.

مثال:
سل
آبله مرغان
سرخک
زونا
سارس