

بیماری هاری و حیوان گزیدگی

مقدمه و اهمیت موضوع:

هاری یک بیماری ویروسی کشنده مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی است. انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گاز گرفتن به آن مبتلا می شوند. اهمیت بیماری به دلایل میزان کشندگی بالا (صد در صد) تلفات و خسارت اقتصادی که بیماری در دام ها ایجاد میکند، هزینه بالای خرید سرم و واکسن ضد هاری است.

راه های انتقال بیماری:

1. گاز گرفتن و پنجه کشیدن حیوان هار .
2. ترشحات حیوان هار: از طریق لیسیدن لب و چشم و بینی صاحبان خود.
3. راه تنفسی: خصوصاً در غارهایی که خفاش آلوده زندگی می کند.
4. راه گوارشی: از طریق خوردن حیوانات تلف شده هار توسط سایر حیوانات گوشتخوار.
5. انتقال از راه جفت و پیوند اعضا.
6. از طریق آسیب ایجاد شده توسط انسان مبتلا به هاری .

علائم بیماری در حیوان:

اولین علامت تغییر رفتار و عادات حیوان است بطوریکه به صاحب خود انس و الفت پیدا می کند یا عصبانی و تندخو می شود و غذای خود را به خوبی نمی خورد بدون مقصد به هرجائی رفته و به هرکسی حمله می کند ، به گاز گرفتن چوب ، سنگ و اشیاء مختلف پرداخته پس از مدتی به علت ناتوانی در بلع کف از دهان حیوان سرازیر شده و مرتباً به زمین می خورد، صدای پارس حیوان خشن و ناموزون می شود ، در موارد کمی با پیشرفت بیماری حیوان به گوشه ای پناه برده ، ابتدا دست ها سپس پاها و سایر اندام ها فلج شده و در اثر فلج دستگاه تنفس می میرد.

علائم بیماری در انسان:

در ابتدا علائم بسیار عمومی و شبیه علائم یک سرما خوردگی است . خارش و سوزش در محل گزیدگی ، احساس هراس ، خستگی ، سردرد ، تب و تشنج ، توهم و هزیان گوئی و گرفتگی عضلات ، که در حلق به دلیل این گرفتگی فرد قادر به نوشیدن آب نمی باشد ، هرگونه عامل تحریک مانند نور ، صدای بلند ، باد و جریان آب وی را به

شدت عصبی کرده و به تدریج با افزایش و تشدید انقباضات شدید عضله قلب و دستگاه تنفسی فرد به کما رفته و می میرد.

اقدامات درمانی لازم در مورد افراد حیوان گزیده قبل از ارجاع به مراکز بهداشتی:

1. شستشوی کامل محل زخم با آب و صابون (حداقل به مدت 5 تا 10 دقیقه و با استفاده از برس)
2. ضد عفونی کردن محل زخم با الکل یا بتادین.
3. مراجعه فوری به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و یا خانه بهداشت

درمان پیشگیری هاری در افراد حیوان گزیده:

1. تزریق واکسن هاری در 3 و یا 5 نوبت و در صورت لزوم تلقیح سرم هاری.
2. تزریق واکسن توام یا ثلاث و سرم کزاز در صورت نیاز.
3. تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک.
4. قطع کامل قسمت له شده و از بین رفته.
5. عدم انجام بخیه در ناحیه زخم.
6. مراقبت و تحت نظر داشتن سگ و یا گربه مهاجم به مدت 10 روز.
7. عدم انجام پانسمان محکم و چند لایه در صورت امکان.

توصیه های لازم:

- * از نگهداری سگ و گربه در منزل خودداری نمائید.
- * از نزدیک شدن و تماس با سگ های ولگرد خودداری کنید.
- * در صورت گاز گرفتن و یا کشیدن پنجه حیوانات هر چند به صورت جزئی مجروح را سریعتر به مرکز بهداشتی و درمانی ارجاع دهید.

* خودداری از ریختن زباله و پسمانده های غذایی در اماکن عمومی و معابر و استفاده از کیسه های مخصوص زباله.

* حیوانات خانگی را واکسینه و قلاده گذاری کنید.

* واکسیناسیون علیه هاری را کامل کرده و تمامی نوبت های توصیه شده را انجام دهید.