

بیماری هاری ، بیماری ویروسی خطرناکی است که ویروس از طریق بزاق آلوده پستانداران مانند سگ ، گربه ، گرگ ، روباه ، خفاش و حیوانات دیگر که معمولاً از راه گازگرفتگی و یا یک زخم باز که با بزاق تماس پیدا نماید به انسان منتقل می شود . فردی که توسط حیوان هار دچار گاز گرفتگی شده در صورت عدم درمان و ابتلا به هاری محکوم به مرگ است . اگر فردی دچار گاز گرفتگی شود و یا پنجه حیوان ایجاد خراش در بدن وی نماید باید با مراکز پیشگیری و درمان هاری در سطح کشور مشاوره نموده و تحت درمان قرار گیرد واکسیناسیون علیه هاری در پنج نوبت انجام می شود که نوبت اول در روز حادثه یا روز مراجعه ، نوبت دوم ۳ روز بعد ، نوبت سوم ۷ روز بعد ، نوبت چهارم ۱۴ روز بعد و نوبت پنجم ۳۰ روز بعد تزریق می گردد . سرم ضد هاری نیز در مواردی که مرکز پیشگیری و درمان هاری لازم بداند تزریق می گردد . در بیمارستان پس از انجام اقدامات اولیه که در ذیل به آن اشاره گردیده است سریعاً به سوپروایزر کنترل عفونت اطلاع رسانی گردد.

سگ یا گربه ای که مبتلا به هاری شود حداکثر به مدت ۱۰ روز زنده می ماند و به مدت ۵ تا ۷ روز قبل از مرگ ویروس را در بزاق خود دارد و توسط گاز گرفتن می تواند ویروس را منتقل نماید . به این دلیل سگ یا گربه مشکوک به هاری را که فردی را گاز گرفته است به مدت ۱۰ روز تحت نظر قرار می دهند که اگر در این مدت بمیرد احتمال اینکه سگ هار باشد وجود دارد و لازم است حیوان از نظر آزمایشگاهی و از لحاظ هاری بررسی شود . در صورتی که ثابت شود حیوان هار بوده است اقدامات لازم برای فردی که دچار گاز گرفتگی شده است باید انجام گیرد.

افرادی که به دلیل شغلی (مانند کارکنان آزمایشگاه تشخیص هاری ، دامپزشکان ، شکارچیان ، مأمورین حفاظت محیط زیست ، جنگلبانان ، کارکنان کشتارگاه ، کسانی که در نیروهای مسلح تعلیم و تربیت سگ را به عهده دارند ، کسانی که برای مطالعه به غارها می روند و به طور کلی کسانی که به نحوی ممکن است مورد گازگرفتگی حیوانات ذکر شده قرار گیرند) با حیوانات در تماس هستند باید علیه بیماری هاری واکسینه شوند . برای پیشگیری از هاری در این افراد واکسن در چهار نوبت تزریق می گردد که در نوبت دوم ، سوم و چهارم به ترتیب ۷ روز ، ۲۸ روز و یک سال بعد از نوبت اول تزریق می گردد و این افراد هر ۳ سال باید یک نوبت واکسن به عنوان یادآوری دریافت نمایند (البته بعد از اندازه گیری آنتی بادی در خون)

نکته مهم:

شست و شوی زخم مربوط به گازگرفتگی حیوان و بخیه نکردن و باز بودن زخم بسیار مهم است و اساس پیشگیری و درمان هاری است . سریعاً و در ساعات اولیه پس از گزش حیوان ، زخم باید با آب و صابون در چند نوبت و به مدت چند دقیقه عمیقاً شستشو داده شود و در جریان آب سیال قرار گیرد . سپس می توان از مواد ضد عفونی کننده مثل بتادین برای زخم استفاده نمود چون ویروس هاری به نور و جریان هوا حساس است در نتیجه زخم نباید بخیه زده شود و حتی الامکان روی زخم باز باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کنترل عفونت / راهنمای بیماریهای واگیر مراجعه گردد.

